



Espaces naturels sensibles de Haute-Loire



Zones humides du Devès

le Lac à St-Jean-de-Nay et St-Privat-d'Allier

Cette zone humide très vaste s'étend sur 41,5 ha et comporte 2 grandes entités : une zone de marais drainé avec un plan d'eau temporaire d'une superficie d'environ 5 ha et une zone tourbeuse ou à tendance tourbeuse sur les pentes à l'ouest du marais sur plus de 35 ha. Celle-ci est largement dominée par des boisements de Pins sylvestres. Un réseau de fossés existe dans ces deux entités drainant les eaux vers une rase principale alimentant un ru rejoignant la vallée de l'Allier par le hameau de Varennes, pour contribuer ensuite au ruisseau du Rouchoux.

Intérêt floristique

Il est important du fait de la mosaïque de milieux humides représentés, mais a certainement été plus marqué. 4 grandes entités peuvent être distinguées :

- des groupements tourbeux ou à tendance tourbeuse non envahis par les boisements, avec la présence notable de Nard raide ;
- des boisements de pins et saules sur les secteurs drainés par les fossés, diminuant le caractère hydromorphe des terrains ;
- des caricaies dans la zone de bas marais ;
- en périphérie, 2 groupements prairies sont encore présents malgré l'abandon du pâturage.

Intérêt faunistique

Il est amoindri par la fuite rapide de l'eau.


Aucune espèce de libellules n'a été observée sur le site.

Peu d'espèces de batraciens ont été trouvées : la Grenouille verte et la Grenouille rousse ont été rencontrées.

10 espèces d'oiseaux ont été contactées sur le site dont 8 sont nicheuses. Ce site constitue un lieu privilégié pour l'observation du Busard cendré.




Grenouilles rousses




Sphaignes

Carte de végétation (téléchargeable sur www.ode43.fr)



- | |
|---|
| 1-8 • Groupements tourbeux et à tendance tourbeuse |
| 9-13 • Cariacées |
| 14-20 • Joncées |
| 21-23 • Deschampsiaies |
| 24-27 • Groupement prairiaux mésohygrophiles à mésophiles |
| Boisements, haies, arbres et arbustes |

Suivi des hauteurs d'eau



Objectifs de gestion et opérations proposés et validés

- Installer deux systèmes de vannage ou de surverse barrant la rase principale afin de maintenir deux plans d'eau successifs le plus longtemps possible au cours de l'année.
- Réimplanter des animaux et du pâturage dans la partie bas-marais.
- Gérer les boisements de résineux dans les parties tourbeuses, en pratiquant des éclaircies, et restaurer certains secteurs tourbeux par de l'étrépage.
- Conserver le réseau de murets et de haies à la périphérie de la dépression qui constitue des refuges pour les populations de batraciens en particulier.
- Poursuivre le travail de connaissance du site, par des inventaires sur les espèces de la flore et de la faune, par des suivis des niveaux d'eau, etc.
- Suivre l'évolution de la décharge et envisager sa stabilisation, voire sa résorption, si les nuisances liées aux dépôts étaient constatées.
- Valoriser le circuit de petites randonnées et celui de la course d'orientation au départ du Vernet.

Carte des objectifs particuliers du plan de gestion (téléchargeable sur www.ode43.fr)



Les différentes phases de la démarche

2001 → Lancement de l'étude
Réunion intercantonale
> Costaros en juin 2001
Lancement de l'étude
Réunion inter cantonale
> Loudes le 5 juin

Commission communale
mise en place à Loudes le 24 juillet

2002 → Présentation de la phase
du diagnostic et développement
des grandes orientations de gestion
> Mairie de Saint-Jean-de-Nay
le 27 mai 2002

2003 → Réunion de validation
des conclusions de l'étude
le 29 juin 2003
> Mairie de Saint-Privat-d'Allier